

University of Groningen

De bruikbaarheid der definitie-methode in de kliniek

Brugma, Petronella Elisabeth

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1921

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Brugma, P. E. (1921). *De bruikbaarheid der definitie-methode in de kliniek*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

De methode van Binet—Simon is beter dan de definitiemethode volgens Gregor, wanneer men het intellect quantitatief wil onderzoeken.

II.

Slechte uitkomsten bij de definitiemethode sluiten een goed intellect niet uit.

III.

Ieder geval van syringmyelie moet met X-stralen behandeld worden.

IV.

Zeer terecht wordt door Kraepelin de paraphrenie van de dementia praecox afgesplitst.

V.

De handgreep van Credé moet door vrouwelijke artsen en vroedvrouwen steeds met twee handen verricht worden.

VI.

De opvatting van Rheindorf, dat de *Oxyuris vermicularis* een overwegende factor zou zijn bij het ontstaan van den acuten appendicitis-aanval, is onjuist.

VII.

Bij spondylitis tuberculosa is de operatie van Albee te verkiezen boven alle andere behandelingsmethoden.

VIII.

De metachromatische korrels van Babes—Ernst mogen bij de bacteriologische diagnose van diphtherie niet beslissen.

IX.

Punctie van het glasvocht, uitgevoerd volgens de voorschriften van zur Nedden, is een ongevaarlijke ingreep.

X.

Bij initiale haemoptoe moet men bloeding uit venectasieën in de trachea uitsluiten.

XI.

In alle gevallen van stationnaire hardhoorigheid, waaronder de patiënten sociaal lijden, is de operatie van Krukenberg geïndiceerd. Geheel of nagenoeg geheel dooven zijn niet geschikt er voor.

XII.

Het is gewenscht, dat het verdedigen van stellingen bij de promotie wordt afgeschaft.

